

# 治験担当医による全般的評価尺度- アトピー性皮膚炎

## vIGA-AD™

### 評価方法:

vIGA スコアとして、各観察時点における病斑全体の外観を最も良く表している、記述に対応するスコアを下表から選択します。形態学的記述のすべての特徴を有する必要はありません。

スコア	形態学的記述
0- ない	アトピー性皮膚炎の炎症兆候がない(紅斑なし、硬化/丘疹なし、苔癬化なし、浸出液/痂皮なし)。炎症後色素沈着過剰症および/または低色素沈着の可能性あり。
1- ほとんどない	知覚できる紅斑や硬化/丘疹形成が殆どなく、および/または苔癬化も最小である。浸出液/痂皮形成なし。
2- 軽度	軽度だが、はっきりとした紅斑（ピンク）、軽度だがはっきりとした硬化/丘疹形成および/または軽度だが、はっきりとした苔癬化が認められる。浸出液/痂皮形成なし。
3- 中度	明確に知覚できる紅斑（暗赤色）、硬化/丘疹形成および/または苔癬化が認められる。浸出液/痂皮形成の可能性あり。
4- 重度	著しい紅斑（深紅または鮮赤色）、著しい硬化/丘疹形成および/または著しい苔癬化が認められる。疾病は広範囲に広がっている。浸出液/痂皮形成の可能性あり。

### 注意:

1. 判断に迷う場合、スコア間で差異を付けるために病斑の範囲を用いてください。

例 :

- 著しい紅斑（深紅または鮮赤色）、丘疹形成/硬化および/または著しい苔癬化が認められるが、範囲は限局的である「3- 中度」。

2. 疾病重症度を評価するときに擦過傷を考慮しないでください。