

## Échelle d'évaluation globale par le chercheur validée pour la dermatite atopique

### VIGA-AD™

#### Instructions:

Le score d'ECG est sélectionné en fonction des descripteurs ci-dessous qui correspondent le mieux à l'aspect des lésions à un point donné dans le temps. Il n'est pas nécessaire que toutes les caractéristiques sous Description morphologique soient présentes.

Résultats	Description morphologique
<b>0 – Aucune lésion</b>	Aucun signe inflammatoire de dermatite atopique (pas d'érythème, pas d'induration ni de papules, pas de lichénification, pas de suintement ni de croûte). Une hyperpigmentation et/ou une hypopigmentation post-inflammatoire peut être présente.
<b>1 – Presque aucune lésion</b>	Érythème à peine perceptible, induration/papules à peine perceptibles et/ou lichénification minimale. Pas de suintement ni de croûte.
<b>2 – Légère</b>	Érythème léger mais distinct (rose), induration/papules légères mais distinctes et/ou lichénification légère mais distincte. Pas de suintement ni de croûte.
<b>3 – Modérée</b>	Érythème nettement perceptible (rouge terne), induration/papules nettement perceptibles et/ou lichénification nettement perceptible. Suintement et croûtes éventuellement présents.
<b>4 – Sévère</b>	Érythème marqué (rouge vif ou foncé), induration/papules marquées et/ou lichénification marquée. Maladie étendue. Suintement ou croûtes éventuellement présents.

#### Remarques :

1. Dans les cas indéterminés, veuillez vous baser sur l'étendue pour faire la distinction entre les cotes.

Par exemple :

- Une cote de 3 (« Modérée ») sera attribué à un patient qui présente un érythème marqué (rouge vif ou foncé), des papules marquées et/ou une lichénification marquée dont l'étendue est limitée.

2. Il ne faut pas tenir compte des excoriations dans l'évaluation de la gravité de la maladie.